

 Hele virksomheten	INTERNKONTROLL HMS	Versjon: Oktober 2018 Utarbeidet av: fagstyret HMS Godkjent av: Amu Nome
	Håndtering av situasjoner med stikkskader med smittefare	

1. Retningslinjer for håndtering av situasjoner med stikkskader og smittefare

- **Sårbehandling**
 - La det blø godt fra stikkstaden / såret
 - Vask med rikelig såpe og vann
 - Om mulig vask til slutt med 70 % desinfeksjonsspritt
- **Oppfølging**
 - Arbeidstaker som har vært utsatt for stikkskade med sprøytespiss som kan være forurenset med blod eller blodprodukt fra mulig **hepatitt Bs-antigen positiv** pasient skal ha:
 - Spesifikt Hepatitt-B immunglobulin
 - Vaksinerings
 - Ta kontakt med fastlege eller bedriftshelsetjenesten
 - Arbeidstaker som har vært utsatt for stikkskade med sprøytespiss som kan være forurenset med mulig **HIV-positivt** blod skal ha:
 - Forebyggende behandling etter avtale med infeksjonsmedisinere
 - Ta kontakt med fastlege eller bedriftshelsetjenesten
 - Arbeidstaker som har vært utsatt for stikkskade med sprøytespiss som kan være forurenset med blod der kilden er **ukjent**, eller det ikke lar seg gjøre å få tatt prøve av vedkommende, skal det innen 48 timer gis:
 - Spesifikt Hepatitt-B immunglobulin
 - En dose Hepatitt B-vaksine
 - Ved stikkskade fra **redskap eller verktøy som kan være forurenset** med jord eller annen smitte:
 - Sårbehandling!
 - Antibiotikabehandling er vanligvis ikke nødvendig, men ved sannsynlig større bakteriell forurensing skal det vurderes av lege.
 - Tetanusvaksine (stivkrampevaksine) skal gis. De fleste er basisvaksinert slik at det er nok med en revaksinasjon.
 - Kontakt fastlegen eller bedriftshelsetjenesten
- **Smitterisikovurdering**
 - Smitterisiko skal vurderes av en faglig kompetent person (lege – infeksjonssykepleier) så snart som mulig etter uhellet.
 - 0-blodprøver skal tas av arbeidstaker som har vært utsett for stikkskade. Prøvesvaret gir grunnlaget for den videre oppfølgingen.
 - Arbeidstaker skal få informasjon om smitterisikoen av en kompetent person.
 - Arbeidstaker som har vært utsatt for mulig smitte fra HIV-positivt blod skal alltid følges opp med infeksjonsmedisinere.