

SMITTE OG VAKSINE I JOBBEN

**VIKTIGSTE FORHOLDSREGEL ER GOD HYGIENE, EGNET ARBEIDSTØY OG VERNEUSTYR (spes. hansker)!
VASK HENDENE!**

SMITTESTOFF / VAKSINE:	ARBEIDSOMRÅDER:
Tetanus (stivkrampe) Skyldes bakterien Clostridium tetani. Tetanusbakterieiesporer finnes utbredt i naturen (øvre del av jordsmonnet) og i tarmkanalen til en rekke dyr. Bakteriesporer kommer inn i kroppen gjennom forurenset sår. Sykdommen smitter ikke fra person til person. Vaksine brukes i dag stort sett bare i kombinasjon med difterivaksine (DT-vaksine) Den gis fra spebarnsalder av. Stort sett alle i Norge er fullvaksinert, men trenger revaksinasjon hvert 10 år.	Jordbruk, gartneri, parkvesen, grunnarbeid, avløp, kloakkanlegg, renovasjon, veterinærvirksomhet, bistandsarbeid i utlandet
Poliomyelitt Poliomyelitt forårsakes av poliovirus. 1 av 100 i voksen alder kan få en mer alvorlig sykdom. Det har ikke forekommet poliosmitte her i landet siden 1969, men det har vært enkelte importerte poliotilfelle. Vaksine: Barn som har fulgt vanlig program, har over 99 % beskyttelse mot poliovirus. Revaksinasjon med en dose anbefales etter 10 år. Personer som er basisvaksinert, vil få beskyttelse etter en enkelt revaksinasjon selv om det er gått flere tiår siden forrige vaksinedose.	Barne-/eldreomsorg, helse, sosialtjenester, asylmottak, avløp, kloakkanlegg, bistandsarbeid i utlandet.
Tuberkulose De fleste norske arbeidstakere er vaksinert mot tuberkulose. Revaksinasjon anbefales ikke for personer med positiv tuberkulintest eller tydelig arr etter vaksinasjon.	Barne- /eldreomsorg, helse, sosialtjenester, asylmottak, avløp, kloakkanlegg,
Hepatitt B Hepatitt B gir leverbetennelse som forårsakes av hepatitt B-virus som kan finnes i blod og i blodholdige kroppsvæsker. Smitte skjer via hud som ikke er hel eller via slimhinner (stikk av blodig sprøyte, blodoverføring, seksuell smitte m.m.). Virus kan ikke trenge gjennom hel hud. Grunnvaksinasjon består vanligvis av 3 doser. Det er ikke behov for revaksinasjon av personer med normalt immunforsvar som er vaksinert etter vanlig skjema. Antistoffmåling før og etter vaksinasjon kan være aktuelt	Barne-/eldreomsorg, helse, sosialtjenester, asylmottak, renovasjon, bistandsarbeid i utlandet, politi, ambulanse-, rednings- og brannmannskaper.
Hepatitt A Hepatitt A-virus forårsaker leverbetennelse, tidligere kalt epidemisk gulsott. Smittemåten er vanligvis fra avføring via forurenset drikkevann eller mat (NB salater, frukt, annen rå mat) eller ved indirekte kontakt (avføring - fluer - fingre) God hygiene er viktigste tiltak. Vaksine finnes i flere typer. Fullvaksinasjon består av 2 doser med minst 6 måneders intervall. Spesifikt immunglobulin gir kortvarig beskyttelse.	Helsevesen, asylmottak, avløp, kloakkanlegg, bistandsarbeid i utlandet